

Allo scopo di implementare la prevenzione della malattia attraverso il controllo del serbatoio canino, il piano regionale prevede:

- ⇒ tutti i cani randagi di età compresa tra 1 e 8 anni, ospitati nei rifugi /canili devono essere controllati almeno una volta all'anno, mediante visita clinica e analisi del sangue,
- ⇒ i proprietari e/o detentori di cani possono richiedere, a pagamento, la visita medica ed il test ematico per la diagnosi della Leishmaniosi, presso strutture veterinarie delle AA.SS.LL. o presso gli ambulatori veterinari privati;
- ⇒ I cani, con e senza padrone, affetti da leishmaniosi devono essere sottoposti a terapia farmacologica secondo specifici protocolli terapeutici ed i casi di malattia devono essere segnalati alle strutture veterinarie delle AA.SS.LL. competenti per territorio.



La SALUTE è

PREVENZIONE PREVENZIONE



www.anagrafecaninacampania.it



La Leishmaniosi canina spiegata al cittadino

Piano di Sorveglianza e
Controllo della
Leishmaniosi canina
Piano dei Controlli Regionale
Pluriennale Ufficiali
(P.C .R.P. 2020-2022)

Campagna di informazione e
sensibilizzazione
della Regione Campania

Cos'è la

leishmaniosi

La leishmaniosi è una malattia che colpisce, in particolare, uomo e cane ed è sostenuta da un protozoo del genere leishmania che parassita le cellule del sistema immunitario.

Sintomi


Nell'uomo può determinare manifestazioni cutanee di difficile diagnosi o forme viscerali caratterizzate, tra il resto, da anemia e febbre elevata;

Nel cane si presenta con dermatiti, congiuntiviti, uveiti, dimagrimento, cachessia.

Tuttavia il cane, pur essendo infetto, può non presentare sintomi evidenti della malattia.

La leishmania è trasmessa esclusivamente dalla puntura di vettori detti **flebotomi** che hanno assunto, attraverso il pasto con sangue di animale infetto, i parassiti agenti della malattia.

- ⇒ Non è possibile il contagio diretto dal cane all'uomo o da uomo a uomo.
- ⇒ Il cane, nel ciclo biologico della leishmania, rappresenta il principale **serbatoio**.
- ⇒ Il flebotomo è attivo maggiormente nel periodo estivo nelle ore comprese tra il tramonto e il sorgere del sole.



Per il cane è in commercio un vaccino anti-Leishmania che non offre protezione assoluta ma sembra in grado di ridurre lo sviluppo della malattia.

Accanto a tali misure di profilassi indiretta, è opportuno adottare le seguenti precauzioni durante tutta la stagione di attività del pappatacio (Maggio - Ottobre) :

- ⇒ Ricoverare i cani dal tramonto al sorgere del sole all'interno di strutture protette nel periodo estivo;
- ⇒ Applicare alle finestre zanzariere a maglie molto strette (lato non superiore a 2 mm);
- ⇒ Applicare repellenti specifici sul corpo del cane, suggeriti dal veterinario di fiducia, assicurandosi che i prodotti siano poco evaporabili o dotare il cane di collare a base di anti-antiparassitari a effetto repellente specifici per i flebotomi.



prevenzione